

VAR NYKTER NÄR DU VÄNTAR BARN

Användning av alkohol kan skada fostret

FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) alltså fetala alkoholspektrumstörningar är ett samlingsnamn för alla typer av fosterskador orsakade av alkoholexponering under fostertiden. De olika typerna av FASD är:

FAS (Fetal Alcohol Syndrome) alltså fetalt alkoholsyndrom.

PFAS (Partial Fetal Alcohol Syndrome) alltså partiellt fetalt alkoholsyndrom.

ARND (Alcohol Related Neurobehavioral Disorder) alltså skada på centrala nervsystemet orsakad av alkoholexponering.

ARBD (Alcohol Related Birth Defect) alltså missbildning på grund av alkoholexponering.

Barnet kan hjälpas genom att få rätt diagnos, rehabilitering och stöd i olika skeden av livet.



Kehitysvamma-
liitto

Alkohol är farligt för fostret under alla skeden av graviditeten

3. TRIMESTERN (VECKORNA 25-40)

Utvecklingen av lungorna och centrala nervsystemet fortsätter. Fostrets utseende utvecklas nu färdigt. Fostret växer snabbt och blir tyngre. Alkohol kan inverka på fostrets utseende, centrala nervsystem och tillväxt.

1. TRIMESTERN (VECKORNA 0-12)

Organen börjar utvecklas (först hjärnan och hjärtat). Armarna, benen och ögonen börjar utvecklas och hjärtat börjar slå. Alkohol kan bland annat orsaka skador på olika organ och på centrala nervsystemet.

2. TRIMESTERN (VECKORNA 13-24)

Nu har i stort sett alla organ bildats och utvecklats. Utvecklingen av ögon, nervsystem, lungor och yttre könsdelar fortsätter. Ansiktsdragen börjar utvecklas.

Alkohol kan bromsa tillväxten och orsaka skador bland annat på fostrets syn, hörsel och centrala nervsystem.