

OLE RAITIS RASKAANA

Alkoholinkäyttö voi vaurioittaa sikiötä

FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) kuvaa sikiövaurioiden laajaa kirjoa. FASDin eri muotoja ovat:

FAS (Fetal Alcohol Syndrome) eli sikiön alkoholioireyhtymä.

PFAS (Partial Fetal Alcohol Syndrome) eli osittainen sikiön alkoholioireyhtymä.

ARND (Alcohol Related Neurobehavioral Disorder) eli alkoholi-altistuksen aiheuttama keskushermoston vaurio.

ARBD (Alcohol Related Birth Defect) eli alkoholin aiheuttama epämuodostuma.

Lasta auttavat oireyhtymän oikea tunnistaminen, kuntoutus ja tuki eri elämänvaiheissa.

www.verneri.net/fasd

www.kehitysvammaliitto.fi/fasd



Kehitysvamma-
liitto

3. RASKAUSKOLMANNES (VIIKOT 25-40)

Keskushermoston ja keuhkojen kehittyminen jatkuu. Sikiön ulkonäkö kasvaa nopeasti ja saa painoa lisää. Alkoholi voi vaikuttaa mm. sikiön ulkonäköön, keskushermostoon ja kasvuun.

1. RASKAUSKOLMANNES (VIIKOT 0-12)

Elinten muodostuminen alkaa (ensimmäisenä aivot ja sydän). Kätet, jalat ja silmät alkavat kehittyä sekä sydän alkaa sykkiä. Alkoholi voi aiheuttaa mm. elin- ja keskushermostovaurioita.

Alkoholi on sikiölle vaarallista raskauden jokaisessa vaiheessa

2. RASKAUSKOLMANNES (VIIKOT 13-24)

Kaikki elimet ovat pääpiirteittäin kehittyneet. Silmien, keskushermoston, keuhkojen ja ulkoisten sukupuolielimien kehittyminen jatkuu. Kasvonpiirteet alkavat muodostua.

Alkoholi voi aiheuttaa vaurioita mm. sikiön näköön, kuuloon, keskushermostoon ja kasvuun.