

# OLE RAITIS RASKAANA

## ALKOHOLINKÄYTTÖ VOI VAURIOITTA A SIKIÖTÄ

**FASD (FETAL ALCOHOL SPECTRUM DISORDERS) KUVAA SIKIÖVAURIOIDEN LAAJAA KIRJOA. FASDIN ERI MUOTOJA OVAT:**

**FAS** (*Fetal Alcohol Syndrome*) eli sikiön alkoholioireyhtymä.

**PFAS** (*Partial Fetal Alcohol Syndrome*) eli osittainen sikiön alkoholioireyhtymä.

**ARND** (*Alcohol Related Neurobehavioral Disorder*) eli alkoholi-altistuksen aiheuttama keskushermoston vaurio.

**ARBD** (*Alcohol Related Birth Defect*) eli alkoholin aiheuttama epämuodostuma.

Lasta auttavat oireyhtymän oikea tunnistaminen, kuntoutus ja tuki eri elämänvaiheissa.

[www.verneri.net/fasd](http://www.verneri.net/fasd) ■ [www.kehitysvammaliitto.fi/fasd](http://www.kehitysvammaliitto.fi/fasd)



**Kehitysvamma-  
liitto**



### **3. RASKAUSKOLMANNES (VIIKOT 25-40)**

Keskushermoston ja keuhkojen kehittyminen jatkuu. Sikiön ulkonäkö kehittyy lopulliseen muotoonsa. Sikiö kasvaa nopeasti ja saa painoa lisää.

Alkoholi voi vaikuttaa mm. sikiön ulkonäköön, keskushermostoon ja kasvuun.

### **1. RASKAUSKOLMANNES (VIIKOT 0-12)**

Elinten muodostuminen alkaa (ensimmäisenä aivot ja sydän). Kätet, jalat ja silmät alkavat kehittyä sekä sydän alkaa sykkiä.

Alkoholi voi aiheuttaa vaurioita ja keskushermostovaurioita.

## **ALKOHOLI ON SIKIÖLLE VAARALLISTA RASKAUDEN JOKAISessa Vaiheessa**

### **2. RASKAUSKOLMANNES (VIIKOT 13-24)**

Kaikki elimet ovat pääpiirteittäin kehittyneet. Silmien, keskushermoston, keuhkojen ja ulkoisten sukupuolielimien kehittyminen jatkuu. Kasvonpiirteet alkavat muodostua.

Alkoholi voi aiheuttaa vaurioita mm. sikiön näköön, kuuloon, keskushermostoon ja kasvuun.